



FICHA TÉCNICA

IMPACT 250 SC

INGREDIENTE ACTIVO	Flutriafol
GRUPO QUIMICO	Triazol
CONCENTRACION Y FORMULACION	250 g/L SC (Suspensión concentrada)
MODO DE ACCION	Sistémico
FABRICANTE / FORMULADOR	Proquimur Ltda.
DISTRIBUIDOR	Farmagro S.A.
ANTIDOTO	No existe antídoto específico, tratamiento sintomático.

TOXICOLOGIA DEL PRODUCTO

IMPACT 250 SC es un fungicida agrícola categorizado como un producto **MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

MECANISMO Y MODO DE ACCION

IMPACT 250 SC es un fungicida sistémico que se absorbe desde la superficie, se trasloca en sentido acropétalo en el xilema y no se acumula en el sitio de entrada.

IMPACT 250 SC se aplica para el control de *Stemphyllium vesicarium* en espárrago, control de *Leveillula taurica* en pimiento y tomate y para el control de *Uncinula necator* en vid.

CONSIDERACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Aplicar **IMPACT 250 SC** de manera de lograr una cobertura uniforme del cultivo a tratar, puede ser aplicado con pulverizadora manual de palanca. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.
- Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto.

FRECUENCIAS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **IMPACT 250 SC** como máximo 1 aplicación por campaña, considerando 2 campañas por año para espárrago, pimiento y tomate y 1 campaña para vid.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas y con productos de reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

IMPACT 250 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.



FICHA TÉCNICA

IMPACT 250 SC**CUADRO DE USOS**

Cultivo	Plaga		Dosis ml/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre técnico			
Espárrago	Mancha purpura	Stemphyllium vesicarium	700	21	0.01
Pimiento	Oidium	<i>Levaillula taurica</i>	350	21	1.0
Tomate	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	350	21	0.01
Vid	Oidium	<i>Uncinula necator</i>	250	21	0.01

PC: Período de Carencia

LMR: Límite máximo de residuo

REGISTROS Y TOLERANCIAS DE RESIDUOS

Para informarse sobre los límites máximos de residuos (LMR) o tolerancias establecidas por CEE (Comunidad Europea) y la EPA (Estados Unidos) en los principales cultivos visite los siguientes links

EU Pesticide Database: (Comunidad Europea)

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database-redirect/index_en.htm

Environmental protection Agency EPA: (Estados Unidos)

[http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-](http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr&sid=21a5f5860937d327f7ffce6097f3ef0c&tpl=/ecfrbrowse/Title40/40cfr180_main_02.tpl)[idx?c=ecfr&sid=21a5f5860937d327f7ffce6097f3ef0c&tpl=/ecfrbrowse/Title40/40cfr180_main_02.tpl](http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr&sid=21a5f5860937d327f7ffce6097f3ef0c&tpl=/ecfrbrowse/Title40/40cfr180_main_02.tpl)**TELEFONOS DE EMERGENCIA****CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398****ESSALUD: 0801-10200 ó 411 8000 (opción 4)****CISPROQUIM 0800-50847****MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PRESENTACIONES COMERCIALES

IMPACT 250 SC cuenta con registro para la siguiente presentación de 1 litro.