FICHA TECNICA
FOLIX PHOS

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa Comercializadora : FARMAGRO S.A.
Proveedor : IMPROVEK

IDENTIDAD

Composición : Fósforo	36.00	%
Nitrógeno	8.00	%
Potasio	5.00	%
Magnesio	0.48	%
Boro	0.05	%
Hierro	0.24	%
Zinc	0.12	%
Manganeso	0.12	%
Cobre	0.12	%
Carbohidratos	0.38	%
Aminoácidos Libres	5.00	%

Formulación : Concentrado Soluble
Clase de Uso : Bionutriente

CARACTERÍSTICAS

Folix Phos es un nutriente órgano mineral con alto contenido de Fósforo, 100% activado orgánicamente por acidos fúlvicos, debido a su avanzada y compleja formulación permite además el aporte de aminoácidos libres lo cual facilita la asimilación de nutrientes.

Folix Phos contiene una alta concentración de elementos mayores, tanto primarios como secundarios, así como de elementos menores, los que se encuentran quelatados orgánicamente.

Folix Phos produce incrementos sobre los niveles de sacarosa en las plantas lo que genera un mejor sabor en los frutos, lo que se traduce en una mejora de la calidad de la cosecha.

Folix Phos participa activamente en los procesos de enraizamiento, desarrollo, crecimiento y multiplicación; aplicado foliarmente en los momentos críticos, aportará una excelente y adecuada nutrición de acuerdo al estado fenológico del cultivo.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

•Densidad Relativa : 1368
•pH : 0.5 - 2.4
•Estado Físico : Líquido
•Color : Marrón oscuro
•Olor : Característico
•Explosividad : No explosivo
•Corrosividad : Si corrosivo
•Estabilidad en Almacenamiento : Es estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento por 2 años.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	Dosis (200Lt)	FORMA Y MOMENTO DE APLICACIÓN
Algodón	500ml - 1Lt	1ra. Cuando las plantas tengan 15 a 20 o al desahije, 2da. Antes de la floración. Repetir aplicaciones hasta alcanzar la madurez de las bellotas.
Cereales, Maíz Sorgo	500ml - 1Lt	1ra. 15 a 20 días después de la emergencia. 2da. Al inicio de embuche. Los siguientes cuando haya deficiencias y/o déficit de desarrollo.
Hortalizas, tomate ají, páprika	500ml - 1Lt	1ra. 15 a 20 días después del transplante. 2da. 10 días después de la primera, 3ª al inicio del botón floral, los siguientes cada 20 días.
Papa	500ml - 1Lt	1ra. Cuando las plantas alcancen de 10 a 15 cm de altura. 2da. Al inicio de la formación de estolones, 3ra. Después del aporque. 4ta. A los 20 días después de la última aplicación. .
Leguminosas, Oleaginosas, frijol y soya	500ml - 1Lt	1ra. 15 días después de la emergencia. 2da. Al inicio del botón floral. Los siguientes cada 10 días hasta alcanzar la madurez de las vainas.
Frut. Caducifolio: Vid, Durazno	500ml - 1Lt	1ra. Al inicio del rebrote de las hojas. 2da. Al desarrollo de los frutos. Los siguientes cuando haya deficiencia y/o déficit de desarrollo.
Frut. Tropical: Naranja o limón	500ml - 1Lt	1ra. Al inicio del rebrote de las hojas 2da. Al desarrollo de los frutos. Los siguientes cuando haya deficiencia y/o déficit de desarrollo.
Café	500ml - 1Lt	1ra. Al inicio del rebrote de las hojas, 2da. Después de la floración, subsecuentes durante el desarrollo del fruto, cada 20 días.
Ornamentales: rosa, clavel	500ml - 1Lt	1ra. Al inicio del rebrote de las hojas. 2da. 10 a 15 días después. Subsecuentes cada tres semanas.
Cucurbitáceas: melón, sandia, pepino	500ml - 1Lt	1ra. 15 días después de la emergencia, 2da. 10 a 15 días después. Luego cada 8 días después del primer corte.
Espárragos	500ml - 1Lt	Aplicar a los 20 o 30 días después de la siembra. Otras aplicaciones después de cada corte.
Col, lechuga, brócoli, tabaco	500ml - 1Lt	1ra. 10 días después del transplante, 2da. 7 días después de la primera, 3ra. Al inicio de la formación del meristemo vegetativo (brócoli y Col), 4ta. 7 días después.
Fresa	500ml - 1Lt	1ra. 10 días después del corte. Subsecuentemente cada 10 días.
Cebolla y ajo	500ml - 1Lt	1ra. Aplicar cuando haya 7 a 9 hojas, 2da. Al inicio del desarrollo del bulbo.
Arroz	500ml - 1Lt	Después del transplante cuando empieza el macollamiento y en "punto de algodón".
Alcachofa	500ml - 1Lt	Aplicar a los 10 días después del transplante y luego 2 aplicaciones a los 25 y 35 días de transplantado.
Cacao, piña	500ml - 1Lt	Aplicar a los 30 días del transplantado y floración.
Stevia	500ml - 1Lt	Aplicar a los 15 días después del transplante.

COMPATIBILIDAD

Folix Phos es compatible con la mayoría de fungicidas, insecticidas y herbicidas de uso común. Sin embargo se recomienda realizar hacer una prueba de compatibilidad.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA

Se recomienda no ingresar a las áreas tratadas hasta 4 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

Folix Phos no es fitotoxico siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

Ligeramente Peligroso