

FICHA TECNICA


FURAFAR

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa Comercializadora : FARMAGRO S.A.
Titular de Registro : FARMAGRO S.A.
Número de Registro : PQUA N° 2623-SENASA

IDENTIDAD

Composición : Benfuracarb
Concentración : 400 g/L
Formulación : Concentrado Emulsionable
Grupo Químico : Carbamato
Clase de Uso : Insecticida - Nematicida.
Fórmula Empírica : $C_{20}H_{30}N_2O_5S$
Fórmula Estructural :



Peso Molecular : 410.53 g/mol

CARACTERISTICAS

FURAFAR es un insecticida-nematicida a base de benfuracarb que aplicado al follaje actúa por contacto e ingestión y con gran efecto residual.

Cuando **FURAFAR** es aplicado al suelo actúa como insecticida y nematicida sistémico al ser absorbido por las raíces.

Se recomienda no usar **FURAFAR** en suelos arenosos ni en zonas con napa freática superficial.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Densidad Relativa : 0.97 - 0.99 (20° C)
pH : 7.0
Estado Físico : Líquido
Color : Marrón
Estabilidad en Almacenamiento : Es estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento por 2 años.

Explosividad : No explosivo
 Corrosividad : No corrosivo
 Inflamabilidad : No inflamable

MODO DE ACCION

FURAFAR tiene acción sistémica y actúa también por contacto e ingestión.

MECANISMO DE ACCION

FURAFAR inhibe la acción de la Acetil Colinesterasa, ocurriendo un aumento de la enzima acetilcolina, produciendo síntomas en el insecto de hiper excitación, parálisis; provocándole la muerte.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/ha		
Papa	Gorgojo de los andes	<i>Premnotrypes suturicallus</i>	0.30	0.45	60	0.001

P.C.: Periodo de Carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **FURAFAR** cuando la infestación se encuentra dentro del nivel del umbral de daño económico. Como máximo una aplicación /campaña al año.

COMPATIBILIDAD

FURAFAR es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

REINGRESO A UN ÁREA TRATADA

No ingresar a las áreas tratadas hasta 48 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

FURAFAR no presenta riesgo de fitotoxicidad si se aplica en el momento y dosis recomendada en la etiqueta

CATEGORIA TOXICOLÓGICA

Ligeramente peligroso